

Beskytt barnet ditt mot kikhoste

Hvorfor bør gravide ta kikhostevaksine?



- Kikhoste er en luftveisinfeksjon som kan gjøre små barn alvorlig syke. Sykdommen er farligst for uvaksinerte barn under 1 år.
- Vaksinasjon i svangerskapet beskytter barnet ditt mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved 3-måneders alder.
- Kikhostevaksinen tilbys gravide i store deler av verden, og gir spedbarn god beskyttelse mot kikhoste.

Hvordan virker vaksinen?



- Gravide som tar vaksine lager beskyttende antistoffer. Antistoffene overføres videre til barnet i magen.
- For at barnet skal få beskyttelse, må du få vaksine mens du er gravid – uansett når du fikk forrige vaksine mot kikhoste.

Under og etter vaksinasjon



- Vaksinen anbefales ved svangerskapskontrollen i uke 24.
- Vaksinen gis med ett sprøytstikk i overarmen.
- Det er vanlig å få litt vondt på stikkstedet, og det kan også bli litt rødt og hovent. Noen får feber, vondt i musklene, føler seg litt syke eller utmattet. Dette går vanligvis over av seg selv i løpet av noen få dager.
- Det er ikke vist at barn får bivirkninger når mor vaksineres mot kikhoste i svangerskapet.
- Kontakt helsepersonell dersom du har spørsmål eller er bekymret for plager/sykdom etter vaksinasjon.

